

## Ratonero moro *Buteo rufinus*

Ejemplar adulto observado durante 3 minutos a las 16:15 del 30 de octubre de 2006 en Marbella. Dos cernícalos lo atacaron y permitieron que el autor pudiera observar, identificar y, posteriormente, fotografiar al ratonero.



Fotos: Kevin Wade

Se trata de una especie de amplia distribución que se extiende desde el norte de África y sureste de Europa hasta Asia central. La subespecie *cirtensis* es la presente en el noroeste africano, mientras que la subespecie *rufinus* ocupa la porción más oriental de su área de distribución. No existen citas históricas de reproducción en la Península Ibérica, y al hacer referencia a la población reproductora española tan sólo cabe reseñar las observaciones realizadas en época de cría en Ceuta, donde se pudo confirmar la cría en 2004, con dos pollos voladeros a finales de junio. A diferencia del Ratonero común *Buteo buteo* nidifica en cortados rocosos, que pueden ser de pequeña envergadura, y solo ocasionalmente se cita su reproducción en árbol. Como estas aves no suelen leer las guías, en el año 2003 tuve la ocasión de observar un nido en el suelo, con pollos, en el sur de Mauritania.

En Málaga se cuenta con observaciones esporádicas y dispersas. Las dos más recientes se deben a Kevin Michael Wade quien pudo observar un ejemplar el 1 de mayo de 2005 en Monda (aceptado por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) y de nuevo pudo ver un individuo el 30 de octubre de 2006 en Marbella. A pesar de que se le considera una especie sedentaria, la cercanía de la población norteafricana permite avistamientos con cierta regularidad en la zona andaluza más cercana al Estrecho de Gibraltar.

Texto: Antonio-Román Muñoz Gallego