

Observaciones de la primera quincena de abril (2011) en el P.N. Desembocadura del Guadalhorce, Málaga.

Antonio Tamayo

- Tarro canelo (*Tadorna ferruginea*) una hembra los días 03 y 05/04/2011.
- Cerceta carretona (*Anas querquedula*) una pareja el 03/04/2011 y un macho el 06/04/2011.
- Negrón común (*Melanitta nigra*) sigue un grupo de 6 (2 machos y 4 hembras) los días 1, 2, 3 y 4 /04/2011.
- Malvasía (*Oxyura leucocephala*) todos los días, 40 ex. (30 machos y 10 hembras) el 02/04/2011 repartidos por las diferentes lagunas.
- Avetorillo (*Ixobrychus minutus*) una hembra el 01/04/2011, un macho el 02/04/2011, una pareja el 04/04/2011.
- Martinetes (*Nycticorax nycticorax*) 6 ex. el 04/04/2011 y 5 ex. el 04/04/2011.
- Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*) una el 05/04/2011 y 2 el 06/04/2011.
- Garza imperial (*Ardea purpurea*) una el 03/04/2011 y 4 el 06/04/2011.
- Morito (*Plegadis falcinellus*) 4 ex. el 29/03/2011.
- Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) un macho el 29/03/2011.
- Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) una el 03/04/2011.
- Canastera (*Glareola pratincola*) una los días 31/03/2011 y el 1, 3 y 4/04/2011, 3 el 12/04/2011.
- Archibebe fino (*Tringa stagnatilis*) 2 ex. el 04/04/2011.
- Andarríos bastardo (*Tringa glareola*) 7 ex. el 31/03/2011, y uno los días 1 y 4/04/2011.
- Págalo pomarino (*Stercorarius pomarinus*) un ex. el 02/04/2011.
- Gaviota picofina (*Larus genei*) 3 ex. (2 ad. y 1 jov.) el 01/04/2011 y 2 ad. el 11/04/2011.
- Gaviota de Delaware (*Larus delawarensis*) ejemplar de 3º verano los días 1 y 4/04/2011.
- Gaviota cana (*Larus canus*) ejemplar de 1º invierno el día 04/04/2011.
- Pagaza piconegra (*Sterna nilotica*) una el 03/04/2011.
- Tórtola común (*Streptopelia turtur*) primer ejemplar del año el 05/04/2011.
- Collalba rubia (*Oenanthe hispanica*) un macho garganta negra el 28/03/2011, el primero del año, más ex. observados los días siguientes.
- Tarabilla norteña (*Saxicola rubetra*) primera del año, un espectacular macho el 04/04/2011.
- Curruca zarcera (*Sylvia communis*) primer ejemplar del año el 01/04/2011.

- Tiburón peregrino (*Cetorhinus maximus*) un ejemplar frente a la playa del paraje nadando en superficie lejos de la costa, lo vi gracias al aviso de Andy al cual lo había avisado un amigo (perdón pero no recuerdo el nombre) que lo había localizado, allí coincidí con Salva García que también se había acercado a observarlo.

Estas son el resto de especies observadas estos días:

- Ánade friso
- Cerceta común
- Ánade Real, una hembra seguida ya de su prole de patitos.
- Pato cuchara

- Porrón común
- Zampullín chico
- Somormujo lavanco
- Alcatraz
- Cormorán grande
- Garcilla bueyera
- Garceta común, se nota paso de esta especie con grupos más numerosos que el resto del año.
- Garza real
- Flamenco rosa
- Aguilucho lagunero
- Cernícalo vulgar
- Gallineta común
- Focha común
- Cigüeñuela, presentes ejemplares reproductores algunas parejas haciendo nidos y grupos de aves en migración sedimentados, por ejemplo el lunes por la tarde vi un grupo grande posado en la laguna grande que tenían toda la pinta de ser un grupo sedimentado durante la migración y estando ese mismo día en la calle en mi barrio sobre las 00:00 de la noche escucho varios ejemplares volando en la oscuridad de la noche, quién sabe si eran algunas de las observadas esa misma tarde en la desembocadura y que ahora de noche proseguían con su periplo migrador.
- Avoceta
- Chorlitejo chico
- Chorlitejo grande
- Chorlitejo patinegro, alguna hembra atareada ya en la incubación.
- Correlimos tridáctilos
- Correlimos común
- Correlimos zarapitín
- Agachadiza común
- Zarapito trinador
- Archibebe común
- Archibebe claro
- Andarríos grande
- Andarríos chico
- Vuelvepiedras
- Gaviota cabecinegra
- Gaviota reidora
- Gaviota de Audouin
- Gaviota sombría
- Gaviota patiamarilla
- Charrán patinegro
- Fumarel cariblanco
- Tórtola turca
- Cotorra de Argentina
- Vencejo pálido
- Martín pescador
- Abejaruco común todos los días pero el día 01/04/2011 con paso notable y constante de grupos siguiendo la costa hacia el norte.
- Abubilla
- Terrera común

- Cogujada común
- Avión zapador precioso observar los bandos mezclados con golondrinas cuando al atardecer ya casi noche vuelan en grupo compacto recorriendo las orillas de las lagunas buscando donde ubicar el dormitorio, así como durante las mañanas van pasando pequeños grupitos siguiendo la costa hacían el norte en migración activa, al igual que las lavanderas boyeras.
- Golondrina común
- Golondrina dáurica
- Avión común
- Bisbita común
- Ruiseñor común
- Collalbas grises, una de las cosas más gratificantes de estos días es recorrer la playa por la mañana para disfrutar literalmente de la lluvia de aves de la noche anterior, así por ejemplo el domingo por la mañana con cielo cubierto que dejaba caer alguna corta lluvia de vez en cuando, caminaba por la playa entre los despojos de caña, raíces, troncos,... depositados por el temporal, la playa termina en el impenetrable carrizal tras el cual se ocultan algunas de las lagunas, tarajes dispersos acá y allá, éstos así como el carrizal y resto de vegetación que levanta apenas unos palmos del suelo están quemados en su cara que da al mar debido a los vientos cargados de sal que los golpean durante los fuertes temporales de levante, así algunos acebuches que crecen en medio del carrizal esta modelados por el levante al mismo estilo que en Tarifa inclinando sus copas hacia tierra adentro como si quisieran levantar sus raíces e huir hacia terrenos menos ventosos. Sobre alguna de las puntas de las cañas así como de los postes del vallado que aún sigue en pie se ven varios alcaudones comunes hasta un mínimo de siete repartidos a lo largo de la porción de playa que veo, atrás deje una discreta hembra de collalba rubia, entre matas de Algodonosa (*Otanthus maritimus*), Carretón de playa (*Medicago marina*) y Azucena de mar (*Pancreatium maritimum*) una pequeña pero poderosa y apuesta Cogujada común camina recogiendo trocitos de hierba seca que va acumulando en su pico sobresaliendo del mismo por ambos lados, la imagen de la cogujada mientras camina con ese material para el nido en el pico sumándolo a su plumaje discreto y su vertical copete, simularía la técnica que la evolución a hecho en otros animales de “romperles” la forma o silueta típica del rostro o del cuerpo, distorsionándolo para que se confunda más con el paisaje y así camuflarse mejor y pasar desapercibidos en el acercamiento a sus presas como los pinceles de las orejas del lince ibérico, en este caso nada que ver con ello pero que disfrutando de la observación de la cogujada con el material en el pico me ha recordado dicha táctica evolutiva.

Un macho de Chorlitejo patinegro de vientre y pecho níveo éste flanqueado por el negro collar inacabado, partes superiores marrón grisáceas, cabeza destacada, frente blanca, comienzo del píleo con franjita negra y bordeando a esta, al resto del píleo y en la nuca unas finas y delicadas pinceladas de un precioso color herrumbroso que engrándese a este pequeño pero potente habitante de las arenas, que chorlitejo más bonito, corretea tranquilo la arena entre matas y despojos de la vegetación, unos instantes he tenido a la vez en el ocular del telescopio al patinegro y a dos collalbas grises que caminaban más atrás, pasa alguna golondrina común y avión zapador que en vuelo rasante pero en migración activa siguen la playa hacia el norte, no consigo localizar a la canastera que de lejos vi posarse en la playa cerca de la zona por donde ahora me hallo, a mi espalda el sonido de las olas que distan apenas 30 metros de mi, olas de día en calma, atrás en el mar no lejos de la costa deje 6 negrones comunes, cuatro hembras y dos machos, uno de ellos luciendo ya su discreto y negro plumaje nupcial pero con su chivata mancha naranja en el pico, el otro seguramente un macho joven quiere imitar en su plumaje a su

compañero pero sin alcanzarlo, el dibujo de las cabezas de las hembras bien definido y marcado, parte superior desde debajo del ojo hacia arriba que se extiende por la nuca y parte posterior del cuello negro sucio, partes inferior grises, bien delimitado, bien definido, mitad superior del rostro oscura mitad inferior clara.

En los maltrechos eucaliptos del fondo varias garzas reales posadas esta mañana temprano junto a ellas había cuatro martinetes adultos que ahora y desde esta posición no consigo localizar, a lo lejos en el extremo de la playa cerca del otro plazo del río, junto al “rebalae” un grupito de gaviotas, varios jóvenes de sombría, dos adultos de audouin y otros tantos jóvenes de cabecinegra. Este amanecer cuando habría la cancela del puente para pasar a la isla un águila pescadora que se acerca al río lo tantea desde el aire y sigue tranquila su curso aguas arriba.

- Zorzal común
- Ruiseñor bastardo
- Buitrón
- Carricero común
- Curruca cabecinegra
- Mosquitero común
- Mosquitero musical
- Carbonero común
- Cuervo
- Grajilla
- Estornino negro
- Gorrión común
- Verderón común
- Jilguero
- Verdecillo
- Pardillo común
- Triguero
- Estornino soberbio (*Lamprotornis superbus*) un ejemplar los días 1 y 12/04/2011.

Muchas de estas observaciones en compañía de los amigos Andy, Federico Valles, Blas Lopez, Patricia Macaulay, Francisco Javier Aranda,... y más visitantes de la desembocadura.