

El Pechiazul (*Luscinia svecica*).

Hay aves que pasan desapercibidas debido a sus hábitos discretos, ya que no a sus colores. Este es el caso del Pechiazul (*Luscinia svecica*), relativamente abundante en Málaga, pero tan confinado en las zonas propicias y de costumbres tan escondedizas que no es mucha la gente que tiene la suerte de verlo.



Dos formas de plumaje de las hembras. Algunas de ellas presentan mucho color.

Sorprende la gran variedad de plumajes que pueden presentar estas aves. Los machos son normalmente diferentes de las hembras, pero dentro de cada sexo existe gran variabilidad, especialmente en los plumajes invernales. Algunas aves no se pueden sexar por el color. Y para complicar más la situación, existen varias subespecies que se diferencian en tamaño y/o coloración.

En Málaga inverna principalmente la subespecie de medalla blanca (*L. s. cyanecula*) de procedencia belga, holandesa y francesa principalmente. En menor medida, la subespecie "*L. s. nammetum*", un



A la izquierda, dos machos en plumaje invernal. A la derecha, otros dos en plumaje nupcial. Uno de ellos, no presenta medalla blanca y en el otro, es pequeña.



Dos machos de la subespecie de medalla blanca (*cyanecula*). A la izquierda, en una de las formas del plumaje invernal, a la derecha, en plumaje nupcial.

pequeño pechiazul de medalla blanca y procedente de la Bretaña francesa. Existe un grupo reducido de aves de gran tamaño, principalmente en la migración de otoño, semejantes a las de la subespecie "*L. s. magna*" distribuida por el Cáucaso, Turquía e Irán. Pero desconocemos todo sobre su origen. La subespecie escandinava, de medalla roja (*L. s. svecica*) tiene una ruta migratoria muy oriental. Si se diese en la Península Ibérica, debería ser considerada como una rareza. Algunos machos de la subespecie "*cyanecula*" presentan a veces, en plumaje invernal, una medalla fuertemente teñida de rojizo, que desaparece con la muda premigratoria. Estas aves han sido confundidas frecuentemente con la subespecie nórdica.

Se pueden encontrar pechiazules en Málaga desde los últimos días de agosto, aunque es en septiembre cuando se dejan notar en cierta cantidad. La migración transcurre durante este mes, octubre y



Dos hábitats del Pechiazul en Málaga. A la izquierda, una zona natural, la Desembocadura del río Vélez y a la derecha, cultivos de caña dulce en Alhaurín de la Torre.

parte de noviembre, pero hay ya invernantes establecidos desde la segunda quincena de septiembre. A mediados de marzo se reduce notoriamente su presencia y una observación en los primeros días de abril puede considerarse anecdótica. Ya desde la segunda quincena de febrero (algunas aves desde antes), los machos presentan su vistoso plumaje nupcial.

Durante la invernada, el Pechiazul frecuenta zonas húmedas con orillas de barro, donde se alimenta entre la vegetación. Pero también se encuentra en cultivos que presentan una fisonomía similar a la de la vegetación palustre (caña dulce, arrozales, maíz).

En Málaga tradicionalmente se ha encontrado muy vinculado a los cultivos de caña dulce, pero el paulatino abandono de este cultivo está llevando a una situación crítica la presencia de esta especie en la provincia, que en pocos años se ha reducido drásticamente.

Hemos tenido contacto con Pechiazules en lugares adecuados de los siguientes términos municipales: Alhaurín de la Torre, Campillos, Cártama, Estepona, Fuengirola, Málaga, Pizarra, Teba y Vélez Málaga.

José A. Cortés

